

Herbicida.

Capacidad  1l  5l  20l**Most Micro HL<sup>®</sup>**

Composición	Pendimetalina 36,5% p/v (365 g/l)
Formulación	(CS) Suspensión de Cápsulas
Nº Registro	25730

**CARACTERÍSTICAS**

MOST MICRO HL es un herbicida selectivo a base de pendimetalina para aplicación en preemergencia o postemergencia precoz contra malas hierbas dicotiledóneas y monocotiledóneas anuales.

**REGISTROS Y USOS**

Efectuar 1 tratamiento por campaña, al suelo en cultivos al aire libre en pulverización a baja presión en un volumen de caldo de 200 – 400 l/ha, con el suelo bien preparado y limpio de malas hierbas, en los siguientes cultivos:

Cultivo	Dosis (l/ha)	Condicionamiento específico (Estado de crecimiento del cultivo)
Naranja, limonero y mandarino (incluido clementino e híbridos)	2,5-3	Aplicación dirigida entre las líneas del cultivo en preemergencia de las malas hierbas, en primavera u otoño. Evitar cualquier contacto con las partes verdes de los árboles
Vid, manzano, peral, melocotonero, cerezo, albaricoquero, almendro, nogal y avellano	2,5-3	Aplicar en pulverización dirigida entre líneas, en invierno, antes del inicio del crecimiento de los brotes, en preemergencia de las malas hierbas.
Tomate y pimiento	1,25-2,2	Aplicar en pretrasplante
Lechuga	1,5-2	Aplicar en pretrasplante
Cebolla y ajo	1-2,5	Aplicar en preemergencia o postemergencia del cultivo (estado de 2-3 hojas)
Zanahoria	2-2,5	Aplicar en preemergencia del cultivo
Patata	1,7-3	Aplicar en preemergencia del cultivo
Girasol	2-3	Aplicar en preemergencia del cultivo
Trigo	1,7-3	Aplicar en preemergencia del cultivo
Maíz	2-3	Aplicar en preemergencia del cultivo
Judía para grano, judía verde, haba para grano, haba verde y guisante para grano, guisante proteaginoso/forrajero, guisante verde	1,7-2,5	Aplicar en preemergencia del cultivo

Algodonero	2-3	Aplicar en presiembra con incorporación o en preemergencia del cultivo
Tabaco	1.25-3	Aplicar en pretrasplante
Soja	2-2.5	Aplicar en preemergencia del cultivo
Ornamentales herbáceas	2.5-3	Aplicación dirigida entre las líneas del cultivo en preemergencia de las malas hierba y en pretrasplante

- Se incluye el nectarino (*P. persica* var. *nucipersica*), el paraguayo (*P. persica* var. *platycarpa*) y otras variedades e híbridos asociados al melocotonero.

**Malas hierbas gramíneas anuales sensibles:**

*Alopecurus myosuroides*, *Digitaria sanguinalis*, *Echinochloa crus-galli*, *Panicum dichotomiflorum*, *Setaria viridis*, *Setaria verticillata*, *Poa annua*.

**Malas hierbas anuales de hoja ancha sensibles:**

*Amaranthus retroflexus*, *Amaranthus blitoides*, *Anagallis arvensis*, *Capsella bursa-pastoris*, *Cardamine hirsuta*, *Chenopodium album*, *Euphorbia* sp., *Polygonum persicaria*, *Polygonum aviculare*, *Polygonum lapathifolium*, *Bilderdykia convolvulus*, *Portulaca oleracea*, *Solanum nigrum*, *Sonchus oleraceus*, *Stachys annua*, *Stellaria media*, *Urtica urens*, *Veronica hederifolia*, *Veronica persica*, *Viola arvensis*.